



# 紅棗重要蟲害

**栽**培紅棗最常見的蟲害有：介殼蟲、斜紋夜盜蟲、毒蛾類、東方果實蠅、金龜子、咖啡木蠹蛾、椿象、二點葉蟊等。預防方式為注重田間衛生與定期修剪，果園保持充足日照、通風良好，可用含毒甲基丁香油或黃色黏紙誘殺果實蠅。綜合上述管理之理念，在於利用田間作物生產時期與害蟲生態資料配合田間栽培管理操作，採取適時、適法及適度之防治策略並落實區域性共同防治，才能充分達到防治紅棗蟲害之效果。

new

## 象鼻蟲危害



紅棗莖部遭危害呈現鋸齒狀



莖部剖開可見幼蟲

## 象鼻蟲



成蟲身長約1-2公厘

## 東方果實蠅



果實蠅在甜美的果實上叮一小孔並產卵



孵化之幼蟲正在啃食果肉



紅棗園懸掛誘引器

## 斜紋夜蛾危害



斜紋夜蛾危害狀

## 蟲體型態



左圖為幼蟲、右圖為成蟲



成蟲在葉片上產卵其外觀為白色絨毛球狀

## 蟲害防治曆

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	防治方法
象鼻蟲													經常清園，並割除枯葉、砍除老株。
東方果實蠅													自果實成熟前2個月或果實蠅密度增加時，加強懸掛誘殺器。 1.藥劑器具：含毒甲基丁香油、黃色黏紙。 2.物理黏劑：上好黏或益黏。
斜紋夜蛾													全園外圍掛性費洛蒙誘引劑，每1分地掛1個，每2星期更新1次誘引劑。

