

# 休閒昆蟲～獨角仙

■文／圖 吳春美



果凍飼養成蟲

可供自衛防身及攀爬之用，雌雄蟲的頭甚小，雌蟲則無頭角及胸角，因此從外觀就可明顯分辨雌雄蟲。

成蟲出現於5~8月，6~7月為其盛期，一般而言，夜行性昆蟲多數具有趨光性，在路燈下極易發現其蹤跡。在野外吸食樹液或水果汁液，要觀賞其蹤影，就要尋找雜木林或成熟果實，在林中找出流有樹液的青剛櫟、枹樹、柞樹、臺灣光蠟樹（白雞油樹）、臺灣欒樹等，這些樹木在炎熱的夏季裡，會從枝幹部滲出樹液來，這些樹液經過酵母菌發酵後，會產生膠狀物質，故容易吸引許多昆蟲前來取食，獨角仙有敏銳的嗅覺，一聞到樹液的味道時，即張開前翅以便使後翅展開，並在飛起那一剎那將六隻腳張開，奮力而且快速地飛去吸食。或利用水果來誘集，這種方法簡單而容易，

一般常用的水果有鳳梨、香蕉和蘋果等，使用鳳梨誘集時，要儘量將鳳梨橫向切成一圈，厚度也要儘量厚些，太薄不易誘集且容易乾枯；或將鳳梨對半剖開，放在路燈下並放在陰涼處避免日曬。若用香蕉誘集，可將香蕉放入絲襪中並懸掛於樹枝上即可，因取食之故，雌雄蟲便有機會交尾以傳宗接代。



♀

♂