



苗栗區農情月刊

第五十期

發行所：行政院農業委員會
苗栗區農業改良場

MIAOLI DISTRICT AGRICULTURAL RESEARCH AND EXTENSION
STATION, COUNCIL OF AGRICULTURE, EXECUTIVE YUAN

發行人：盧煌勝

總編輯：林洋三

主編：吳瑾谷

地址：苗栗縣公館鄉館南村 261 號

電話：(037) 222111

傳真：(037) 221277、220651

網址：www.mdais.gov.tw

本場單一窗口服務專線

電子郵件：mdais@mdais.gov.tw

農業諮詢服務：(037) 236583

GPN 2008800214

工本費：5 元

設計印刷：漢大印刷股份有限公司

電話：(02) 29555282

傳真：(02) 29577174

國內郵資已付
苗栗郵局
公館支局
許可證
苗栗字第 152 號

雜誌

本期要目

◆ 高接梨嫁接期乾旱之因應對策

◆ 農委會、客委會輔導苗栗縣苑裡鎮良質蜜餞米品質競賽及有機米金燦獎比賽同時開鑼

◆ 發展地方伴手禮計畫成果發表

◆ 行政院農業委員會苗栗區農業改良場九十二年辦理示範推廣教育訓練與活動表

高接梨嫁接期乾旱之因應對策

■ 作物改良課 劉雲聰

本轄區自 92 年 9 月中以來雨水稀少，至今處於乾旱(暖冬)環境，由於高接梨嫁接適期在 12 月中旬至次年 1 月下旬。目前農民處於供穗與天候之不良雙重因素影響下，導致高接梨生產隱憂浮現。基於如此，特提出以下建議供果農參考：

1. 以往採先量再質之生產方式，由於穗源減少，建議果農調整生產策略為質量並重，或重質減量之生產模式，減少每株嫁接花苞數，以降低樹體負擔，進而減低接穗需求量。如生長勢過旺株，可保留較多之橫山梨花芽，或烏梨著果數增加，以使生殖生長與營養生長得以平衡。
2. 接穗大量改從梨山買穗者，宜先抽驗花苞鱗片是否夾帶梨木蝨。嫁接成活後，隨時檢視，如發生蟲害請依推薦防治方法，徹底防治害蟲。
3. 目前正處於乾旱期，水源缺乏區早嫁接果園，因土壤乾燥，水分不足，故花苞無法膨大萌動。有

此現象果園，如有可能載水澆灌者，灌水後，宜以塑膠布覆蓋，保濕兼保溫，如此有助花苞萌放開花。

4. 已嫁接果園如採沾蠟者，宜以小塑膠袋套住花苞，以保持濕度，可避免接穗失水，影響嫁接成活率。
5. 將進行嫁接者，宜採傳統法保護接穗。利用半截黑色之塑膠袋保護接穗，可降低水分散失。
6. 水源充足之果園，約 5-7 日澆灌一次，每次每株約需 150~200 公升水，使其 30 公分土層土壤能保持濕潤，以確保嫁接成活率。如特別早接之梨園花苞將開者，果園每日早晚應噴水，以保持空氣濕度，方可延長花朵開放時間，有利蜜蜂授粉或人工授粉。
7. 本年屬暖冬氣候，無法滿足梨低溫需求時數，缺乏水源之梨園，忌用氰銨催芽法，以避免傷及花苞而得不償失。

