

# 獨立培養

8-9月



- 2.5吋鉢苗：在出苗前約一個月，需切斷走蔓，培養子株獨立生長能力。切斷走蔓後子株處於虛弱狀態，應勤加巡園、防治病害。出苗植株葉片數約為5片。
- 裸根苗：無此階段，即取即種。

- \* 假植：此時將裸根苗自介質挖出，種植於軟鉢內之操作。因氣候炎熱，病害易發生，風險極高，此步驟已逐漸捨棄。
- \* 若2.5吋鉢苗無獨立培養步驟，移動栽培環境或定植時，植株容易弱化死亡。

# 出苗至定植

9-10月



種苗栽培環境改變，植株處於弱勢狀態，應參考育苗場管理模式，勤加防治病害，不可因病徵輕微而掉以輕心。

氣候暖化，育苗不易。選用防檢局「草莓種苗病害驗證作業須知」驗證通過之專業育苗場生產之種苗，提高成功率，種得更放心！

- \* 氣溫過高時，植株弱勢勿定植。
- \* 定植後，種苗生長勢恢復再追肥。
- \* 裸根苗定植，須於植株生長勢恢復及氣溫降低後，再覆蓋塑膠布。



行政院農業委員會苗栗區農業改良場  
Miaoli District Agricultural Research and Extension  
Station, Council of Agriculture, Executive Yuan



ADD / 363201 苗栗縣公館鄉館南村261號  
TEL / 037-222111 FAX / 037-221277  
<https://www.mdais.gov.tw>



# 上盆

## 4月



- 2.5吋繁殖母株苗越冬時，避免開花結果。需持續汰除弱病株。
- 繁殖母株苗移植到大盆稱「上盆」。
- 新葉長出後，可酌施平均肥促進生長。
- 此階段為檢測潛伏病害時機。應選用無病徵之健壯種苗。病害管理以汰除為主、防治為輔，避免後續子株種苗病害發生失控。

\* 平均肥：氮、磷、鉀含量相近之肥料。



# 走蔓產生

## 5-6月



草莓種苗以走蔓繁殖，走蔓產生的時間依品種不同，通常「豐香」、「戀香」在5月，「香水」在6月。

\* 單株母株的子株繁殖數通常以1：35 (豐香) 或1：50 (香水) 估算。




# 子株繁殖

## 6-8月



2.5吋鉢苗



裸根苗

- 此階段不切斷走蔓。
- 子株施肥易誘導病害發生，應加強注意施肥量。
- 子株繁殖初期之病害以汰除為主，後期以防治為主。遮雨設施與滴灌方式能降低病害傳播。
- 選用開2-3片葉、帶有3-5條潔白不定根之走蔓子株，以固定叉使其穩定接觸容器內介質而誘導發根。

\* 穴植管苗管理難度較高，不建議使用。