

## 「氟芬隆」農藥使用方法及其範圍

中華民國 112 年 3 月 13 日農授防字第 1121488356C 號公告修正

### 9.6(%) (w/w) 氟芬隆 水分散性乳劑 (DC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
高粱	玉米螟	0.3 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥。	7			7		
蔥	夜蛾類	0.3-0.5 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥。	7			12		
蔥	葉蟬類	0.5-0.75 公升	2,000	害蟬發生初期(當葉蟬每葉達 3-5 隻)開始施藥，共 1 次。				12		
薑	玉米螟	0.3-0.4 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥。	7			12		
瓜菜類	夜蛾類	0.3-0.7 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥。	7			6		
瓜果類	夜蛾類	0.3-0.7 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥。	7			6		
瓜果類	葉蟬類	0.5-0.6 公升	2,000	害蟬發生時開始施藥。	7			6		
瓜果類	二點葉蟬	0.5-0.6 公升	2,000	害蟬發生時開始施藥。	7	2		6		
茉莉	葉蟬類	0.5- 1.25 公升	2,000	害蟬發生時開始施藥。	7			6		
茶	捲葉蛾類	0.5 公升	2,000	害蟲發生時施藥 1 次。				15		
蒜	葉蟬類	0.5-0.75 公升	2,000	害蟬發生初期(當葉蟬每葉達 3-5 隻)開始施藥，共 1 次。				12	適用於蒜葉。	本項新增。
蒜	葉蟬類	0.5-0.75 公升	2,000	害蟬發生初期(當葉蟬每葉達 3-5 隻)開始施藥，				12	適用於蒜頭。	本項新增。

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
				共 1 次。						
珠蔥	葉蟬類	0.5-0.75 公升	2,000	害蟬發生初期(當葉蟬每葉達 3-5 隻)開始施藥，共 1 次。				12	適用於珠蔥葉。	本項新增。
珠蔥	葉蟬類	0.5-0.75 公升	2,000	害蟬發生初期(當葉蟬每葉達 3-5 隻)開始施藥，共 1 次。				12	適用於紅蔥頭。	本項新增。
落蕃	葉蟬類	0.5-0.75 公升	2,000	害蟬發生初期(當葉蟬每葉達 3-5 隻)開始施藥，共 1 次。				12	適用於落蕃葉。	本項新增。
落蕃	葉蟬類	0.5-0.75 公升	2,000	害蟬發生初期(當葉蟬每葉達 3-5 隻)開始施藥，共 1 次。				12	適用於落蕃頭。	本項新增。
韭菜	葉蟬類	0.5-0.75 公升	2,000	害蟬發生初期(當葉蟬每葉達 3-5 隻)開始施藥，共 1 次。				12		本項新增。
洋蔥	葉蟬類	0.5-0.75 公升	2,000	害蟬發生初期(當葉蟬每葉達 3-5 隻)開始施藥，共 1 次。				12		本項新增。

100 g/L (10% w/v) 氟芬隆 水分散性乳劑 (DC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
高粱	玉米螟	0.3 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥。	7			7		
蔥	夜蛾類	0.3-0.5 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥。	7			12		
蔥	葉蟬類	0.5-0.75 公升	2,000	害蟬發生初期(當葉蟬每葉達 3-5 隻)開始施藥，共 1 次。				12		
薑	玉米螟	0.3-0.4 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥。	7			12		
瓜菜類	夜蛾類	0.3-0.7 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥。	7			6		
瓜果類	夜蛾類	0.3-0.7 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥。	7			6		
瓜果類	葉蟬類	0.5-0.6 公升	2,000	害蟬發生時開始施藥。	7			6		
瓜果類	二點葉蟬	0.5-0.6 公升	2,000	害蟬發生時開始施藥。	7	2		6		
茉莉	葉蟬類	0.5- 1.25 公升	2,000	害蟬發生時開始施藥。	7			6		
茶	捲葉蛾類	0.5 公升	2,000	害蟲發生時施藥 1 次。				15		
蒜	葉蟬類	0.5-0.75 公升	2,000	害蟬發生初期(當葉蟬每葉達 3-5 隻)開始施藥，共 1 次。				12	適用於蒜葉。	本項新增。
蒜	葉蟬類	0.5-0.75 公升	2,000	害蟬發生初期(當葉蟬每葉達 3-5 隻)開始施藥，共 1 次。				12	適用於蒜頭。	本項新增。
珠蔥	葉蟬類	0.5-0.75 公升	2,000	害蟬發生初期(當葉蟬每葉達 3-5 隻)				12	適用於珠蔥葉。	本項新增。

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
				開始施藥， 共 1 次。						
珠蔥	葉蟎類	0.5-0.75 公升	2,000	害蟎發生初期(當葉蟎每葉達 3-5 隻) 開始施藥， 共 1 次。				12	適用於紅蔥頭。	本項新增。
落蕃	葉蟎類	0.5-0.75 公升	2,000	害蟎發生初期(當葉蟎每葉達 3-5 隻) 開始施藥， 共 1 次。				12	適用於落蕃葉。	本項新增。
落蕃	葉蟎類	0.5-0.75 公升	2,000	害蟎發生初期(當葉蟎每葉達 3-5 隻) 開始施藥， 共 1 次。				12	適用於落蕃頭。	本項新增。
韭菜	葉蟎類	0.5-0.75 公升	2,000	害蟎發生初期(當葉蟎每葉達 3-5 隻) 開始施藥， 共 1 次。				12		本項新增。
洋蔥	葉蟎類	0.5-0.75 公升	2,000	害蟎發生初期(當葉蟎每葉達 3-5 隻) 開始施藥， 共 1 次。				12		本項新增。