

「液化澱粉芽孢桿菌 QST713」農藥使用方法及其範圍

中華民國 112 年 6 月 1 日農授防字第 1121488748C 號公告修正

1x10⁹ CFU/g 以上 液化澱粉芽孢桿菌 QST713 水懸劑 (SC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
豆科乾豆類	露菌病	1.5-3.0 公升	400	病害發生初期開始施藥。	7	連續 3 次				
向日葵	露菌病	2.0-3.0 公升	400	病害發生初期開始施藥。	7	連續 3 次				
十字花科包葉菜類	露菌病	1.8-3.8 公升	400	病害發生初期開始施藥。	7	連續 3 次				
菊科包葉菜類	露菌病	2.0-3.0 公升	400	病害發生初期開始施藥。	7	連續 3 次				
結球萵苣	露菌病	3 公升	400	4 片本葉前開始施藥。	7	連續 3 次				
十字花科小葉菜類	露菌病	1.5-3.8 公升	400	病害發生初期開始施藥。	7	連續 3 次				
菊科小葉菜類	露菌病	2.0-3.0 公升	400	病害發生初期開始施藥。	7	連續 3 次				
不結球萵苣與半結球萵苣	露菌病	3 公升	400	4 片本葉前開始施藥。	7	連續 3 次				
蔥科小葉菜類	露菌病	1.9-2.6 公升	400	病害發生初期開始施藥。	7	連續 3 次				
葫蘆科小葉菜類	露菌病	1.9-4.5 公升	400	病害發生初期開始施藥。	7	連續 3 次				
羅勒	露菌病	0.6-1.9 公升	400	病害發生	7	連續				

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事 項	說明
		公升		初期開始 施藥。		3 次				
紫蘇	露菌病	0.6-1.9 公升	400	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 3 次				
仙草	露菌病	0.6-1.9 公升	400	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 3 次				
薄荷	露菌病	0.6-1.9 公升	400	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 3 次				
菠菜	露菌病	0.6-1.9 公升	400	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 3 次				
十字花 科根菜 類	露菌病	2.0-3.8 公升	400	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 3 次				
菊科根 菜類	露菌病	2.0-3.0 公升	400	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 3 次				
蔥科根 菜類	露菌病	1.9-2.6 公升	400	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 3 次				
瓜菜類	露菌病	1.9-4.5 公升	400	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 3 次				
豆科豆 菜類	露菌病	1.3-3.8 公升	400	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 3 次				
瓜果類	露菌病	1.9-4.5 公升	400	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 3 次				
菊	露菌病	2.0-3.0 公升	400	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 3 次				
金盞花	露菌病	2.0-3.0 公升	400	病害發生 初期開始	7	連續 3 次				

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事 項	說明
				施藥。						
洋甘菊	露菌病	2.0-3.0 公升	400	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 3 次				
蟛蜞菊	露菌病	2.0-3.0 公升	400	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 3 次				
咸豐草	露菌病	2.0-3.0 公升	400	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 3 次				
洋桔梗	露菌病	2.0-3.0 公升	400	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 3 次				
鳳仙	露菌病	1.5-2.5 公升	400	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 3 次				
山防風	露菌病	2.0-3.0 公升	400	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 3 次				
風茹	露菌病	2.0-3.0 公升	400	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 3 次				
艾草	露菌病	2.0-3.0 公升	400	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 3 次				
丹參	露菌病	0.6-1.9 公升	400	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 3 次				
草莓	灰黴病	5 公升	400	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 3 次				本項新增。 原始登記廠 商名稱：台 灣拜耳股份 有限公司。