

「氟殺克敏」農藥使用方法及其範圍

中華民國 112 年 6 月 1 日農授防字第 1121488748D 號公告修正

500 g/L (50% w/v) 氟殺克敏 水懸劑 (SC)

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
豆科乾 豆類	白粉病	0.1-0.2 公升	5,000	病害發生初期開 始施藥。	7			21		
豆科乾 豆類	炭疽病	0.2-0.3 公升	2,500	病害發生初期開 始施藥。	10			21		
豆科乾 豆類	灰黴病	0.2-0.3 公升	2,400	病害發生初期開 始施藥。	7			21		
胡麻	白粉病	0.1-0.2 公升	5,000	病害發生初期開 始施藥。	7			21		
甘藷	炭疽病	0.1-0.6 公升	2,500	病害發生初期開 始施藥。	10			7		
豆薯	白粉病	0.1-0.2 公升	5,000	病害發生初期開 始施藥。	7			7		
豆薯	炭疽病	0.2-0.3 公升	2,500	病害發生初期開 始施藥。	10			7		
豆薯	灰黴病	0.2-0.3 公升	2,400	病害發生初期開 始施藥。	7			7		
狗尾草	白粉病	0.1-0.2 公升	5,000	病害發生初期開 始施藥。	7			7		
狗尾草	炭疽病	0.2-0.3 公升	2,500	病害發生初期開 始施藥。	10			7		
狗尾草	灰黴病	0.2-0.3 公升	2,400	病害發生初期開 始施藥。	7			7		
闊葉大 豆	白粉病	0.1-0.2 公升	5,000	病害發生初期開 始施藥。	7			7		
闊葉大 豆	炭疽病	0.2-0.3 公升	2,500	病害發生初期開 始施藥。	10			7		
闊葉大 豆	灰黴病	0.2-0.3 公升	2,400	病害發生初期開 始施藥。	7			7		
山藥	炭疽病	0.4-0.5 公升	2,500	病害發生初期開 始施藥。	10			7		
蘿蔔	炭疽病	0.1-0.4 公升	2,500	病害發生初期開 始施藥。	10			7		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
蕪菁	炭疽病	0.1-0.4 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	10			7		
山葵	炭疽病	0.1-0.4 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	10			7		
牛蒡	白粉病	0.2-0.3 公升	5,000	病害發生初期開始施藥。	7			7		
牛蒡	炭疽病	0.1-0.4 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	10			7		
馬鈴薯	白粉病	0.1-0.3 公升	5,000	病害發生初期開始施藥。	7			7		
馬鈴薯	灰黴病	0.2-0.6 公升	2,400	病害發生初期開始施藥。	7			7		
胡蘿蔔	白粉病	0.2-0.6 公升	5,000	病害發生初期開始施藥。	7			7		
蘆筍	灰黴病	0.4-0.5 公升	2,400	病害發生初期開始施藥。	7			7		
茄科果 菜類	白粉病	0.1-0.3 公升	5,000	病害發生初期開始施藥。	7			6		
茄科果 菜類	炭疽病	0.2-0.6 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	10			6		
茄科果 菜類	灰黴病	0.2-0.6 公升	2,400	病害發生初期開始施藥。	7			6		
番茄	灰黴病	0.4 公 升	4,000	病害發生初期開始施藥。	7	3		6		
甜椒	炭疽病	0.35 公 升	2,500	病害發生初期開始施藥。	10	2		6		
洛神葵	炭疽病	0.2-0.5 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	10			6		
瓜菜類	白粉病	0.15 公 升	5,000	病害發生初期開始施藥。	7			5		
瓜菜類	炭疽病	0.3-0.8 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	10			5		
豆菜類	白粉病	0.1-0.2 公升	5,000	病害發生初期開始施藥。	7			7		
豆菜類	炭疽病	0.2-0.3 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	10			7		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
豆菜類	灰黴病	0.2-0.3 公升	2,400	病害發生初期開始施藥。	7			7		
瓜果類	白粉病	0.2-0.4 公升	5,000	病害發生初期開始施藥。	7			7		
瓜果類	炭疽病	0.3-0.8 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	10			5		
木瓜	白粉病	0.33 公 升	6,000	病害發生初期開始施藥。	7	連續 3 次		14		
草莓	白粉病	0.2-0.4 公升	5,000	病害發生初期開始施藥。	7			9		
草莓	炭疽病	0.3-0.8 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	10			9		
草莓	灰黴病	0.375 公升	2,400	病害發生初期開始施藥。	7			9		
葡萄	銹病	0.2 公 升	6,000	病害發生初期開始施藥。	10	3		12		
葡萄	白粉病	0.2 公 升	6,000	病害發生初期開始施藥。	7	連續 3 次		12		
無花果	銹病	0.1-0.3 公升	6,000	病害發生初期開始施藥。	10			12		
檬果	白粉病	0.2-0.25 公升	6,000	病害發生初期開始施藥。	7	連續 3 次		14		
梨	銹病	0.07-0.4 公升	6,000	病害發生初期開始施藥。	10			14		
蘋果	銹病	0.07-0.4 公升	6,000	病害發生初期開始施藥。	10			14		
桃	銹病	0.07-0.4 公升	6,000	病害發生初期開始施藥。	10			21		
梅	銹病	0.07-0.4 公升	6,000	病害發生初期開始施藥。	10			21		
李	銹病	0.07-0.4 公升	6,000	病害發生初期開始施藥。	10			21		
枇杷	銹病	0.07-0.4 公升	6,000	病害發生初期開始施藥。	10			14		
鼠李科 梨果類	銹病	0.1-0.2 公升	6,000	病害發生初期開始施藥。	10			14		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
花木	白粉病	0.1-0.5 公升	5,000	病害發生初期開始施藥。	7	連續 3 次			使用前宜先進行小面積藥害測試。	
花木	炭疽病	0.2-1.0 公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	10	連續 2 次			使用前宜先進行小面積藥害測試。	
蓖麻	灰黴病	0.3-0.7 公升	2,400	病害發生初期開始施藥。	7					
黃麻	灰黴病	0.3-0.5 公升	2,400	病害發生初期開始施藥。	7					
鐘麻	灰黴病	0.4-0.5 公升	2,400	病害發生初期開始施藥。	7					
亞麻	灰黴病	0.4-0.7 公升	2,400	病害發生初期開始施藥。	7					
檬果	炭疽病	0.6-0.75 公升	2,000	開花初期開始施藥，每隔 7 天施藥 1 次，共 4 次；謝花結果後每隔 14 天施藥 1 次，至套袋前為止，共 4 次。開花初期至套袋共計施藥 8 次。				14		本項新增。原始登記廠商名稱：台灣巴斯夫股份有限公司。