

「左旋莫多草」農藥使用方法及其範圍

中華民國 112 年 6 月 1 日農授防字第 1121488748E 號公告修正

87.3%(w/w) 左旋莫多草 乳劑 (EC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
落花生	雜草	1.2 公 升	稀釋至 600 公 升	播種覆土 後。					將藥劑噴於 土壤表面。 施用時土壤 需要潮濕， 如土壤乾燥 時，施藥後 輕輕拌土或 鬆土，可增 加藥效。	

960 g/L (96% w/v) 左旋莫多草 乳劑 (EC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期(天)	注意事項	說明
高粱	雜草	1.2 公 升	加水至 600 公 升	整地後， 土壤表面 濕潤時， 藥液均勻 噴施於土 壤表面後 7 日播 種。					高粱種子及幼 苗對除草劑極 為敏感，勿任 意提高用藥 量，以免發生 藥害。	
落花生	雜草	1.2 公 升	稀釋至 600 公 升	播種覆土 後。					將藥劑噴於土 壤表面。施用 時土壤需要潮 濕，如土壤乾 燥時，施藥後 輕輕拌土或鬆 土，可增加藥 效。	
大豆	雜草	1.2 公 升	加水至 600 公 升	播種覆土 後，均勻					1. 施用時土 壤需要潮	本項新 增。

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
			升	<u>噴施於土 壤表面。</u>					<u>濕，如土壤 乾燥時，施 藥後輕輕 拌土或鬆 土，可增加 藥效。</u> 2. <u>防除對象：</u> <u>牛筋草、稗 草、馬唐、 碎米莎草、 馬齒莧、空 心蓮子草、 青莧等。</u> 3. <u>適用於乾 大豆。</u>	
<u>紅豆</u>	<u>雜草</u>	1.2 公 升	加水至 600 公 升	<u>播種覆土 後，均勻 噴施於土 壤表面。</u>					1. <u>施用時土 壤需要潮 濕，如土壤 乾燥時，施 藥後輕輕 拌土或鬆 土，可增加 藥效。</u> 2. <u>防除對象：</u> <u>牛筋草、稗 草、馬唐、 碎米莎草、 馬齒莧、空 心蓮子草、 青莧等。</u>	本項新 增。