

「氣派瑞」農藥使用方法及其範圍

中華民國 112 年 6 月 1 日農授防字第 1121488748F 號公告修正

500 g/L (50% w/v) 氣派瑞 水懸劑 (SC)

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
番茄	根瘤線 蟲	0.2 公 升	4,000	於植株定植 後第 3 天澆 灌 藥 液 1 次，每株澆 灌 40 毫升， 或每公頃澆 灌 800 公升 藥液。					施用前請保持 土壤濕潤。	
甜椒	根瘤線 蟲	0.1-0.3 公升	4,000	於植株定植 後澆灌藥液 1 次，每株 澆灌 40 毫 升，或依植 株栽培密 度，每公頃 澆灌 250- 1,000 公升 藥液。					施用前請保持 土壤濕潤。	
辣椒	根瘤線 蟲	0.1-0.3 公升	4,000	於植株定植 後澆灌藥液 1 次，每株 澆灌 40 毫 升，或依植 株栽培密 度，每公頃 澆灌 250- 1,000 公升 藥液。					施用前請保持 土壤濕潤。	
茄子	根瘤線 蟲	0.1-0.3 公升	4,000	於植株定植 後澆灌藥液 1 次，每株 澆灌 40 毫 升，或依植					施用前請保持 土壤濕潤。	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
				株栽培密度，每公頃澆灌 250-1,000 公升藥液。						
枸杞	根瘤線蟲	0.1-0.3 公升	4,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 250-1,000 公升藥液。					施用前請保持土壤濕潤。	
香瓜茄	根瘤線蟲	0.1-0.3 公升	4,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 250-1,000 公升藥液。					施用前請保持土壤濕潤。	
樹番茄	根瘤線蟲	0.1-0.3 公升	4,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 250-1,000 公升藥液。					施用前請保持土壤濕潤。	
瓜菜類	根瘤線蟲	0.01-0.3 公升	4,000	於植株定植後澆灌藥液					1. 施用前請保持土壤	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
				1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 50-1,000 公升藥液。					濕潤。 2. 胡瓜、美濃瓜嫩葉接觸到較高劑量氟派瑞時，會引起葉緣發生黃白化藥斑之現象。	
瓜果類	根瘤線蟲	0.01-0.3 公升	4,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 50-1,000 公升藥液。					1. 施用前請保持土壤濕潤。 2. 胡瓜、美濃瓜嫩葉接觸到較高劑量氟派瑞時，會引起葉緣發生黃白化藥斑之現象。	
香蕉	根瘤線蟲	0.45 公升	10,000	限苗期使用，使用前須維持根圈土壤濕潤，每株澆灌 2-3 公升藥液。						
草莓	根瘤線蟲	0.46-0.72 公升	4,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，施用前保持土壤濕潤。						

400 g/L (40% w/v) 氟派瑞 水懸劑 (SC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
番茄	根瘤線蟲	0.266 公升	3,000	於植株定植後第 3 天澆灌稀釋藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或每公頃澆灌 800 公升藥液。					施用前保持土壤濕潤。	
甜椒	根瘤線蟲	0.1-0.4 公升	3,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 250-1,000 公升藥液。					施用前請保持土壤濕潤。	
辣椒	根瘤線蟲	0.1-0.4 公升	3,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 250-1,000 公升藥液。					施用前請保持土壤濕潤。	
茄子	根瘤線蟲	0.1-0.4 公升	3,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 250-					施用前請保持土壤濕潤。	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
				1,000 公升 藥液。						
枸杞	根瘤線 蟲	0.1-0.4 公升	3,000	於植株定植 後澆灌藥液 1 次，每株 澆灌 40 毫 升，或依植 株栽培密 度，每公頃 澆灌 250- 1,000 公升 藥液。					施用前請保持 土壤濕潤。	
香瓜茄	根瘤線 蟲	0.1-0.4 公升	3,000	於植株定植 後澆灌藥液 1 次，每株 澆灌 40 毫 升，或依植 株栽培密 度，每公頃 澆灌 250- 1,000 公升 藥液。					施用前請保持 土壤濕潤。	
樹番茄	根瘤線 蟲	0.1-0.4 公升	3,000	於植株定植 後澆灌藥液 1 次，每株 澆灌 40 毫 升，或依植 株栽培密 度，每公頃 澆灌 250- 1,000 公升 藥液。					施用前請保持 土壤濕潤。	
瓜菜類	根瘤線 蟲	0.01-0.4 公升	3,000	於植株定植 後澆灌藥液 1 次，每株 澆灌 40 毫 升，或依植					1. 施用前請 保持土壤 濕潤。 2. 胡瓜、美 濃瓜嫩葉	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
				株栽培密度，每公頃澆灌 50-1,000 公升藥液。					接觸到較高劑量氟派瑞時，會引起葉緣發生黃白化藥斑之現象。	
瓜果類	根瘤線蟲	0.01-0.4 公升	3,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 50-1,000 公升藥液。					1. 施用前請保持土壤濕潤。 2. 胡瓜、美濃瓜嫩葉接觸到較高劑量氟派瑞時，會引起葉緣發生黃白化藥斑之現象。	
香蕉	根瘤線蟲	0.6 公升	7,500	限苗期使用，使用前須維持根圈土壤濕潤，每株澆灌 2-3 公升藥液。						
草莓	根瘤線蟲	0.62-0.96 公升	3,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，施用前保持土壤濕潤。						
洋蔥	根瘤線蟲	0.5 公升	3,000	於植株定植後第 3 天，澆灌藥液 1 次，施用前請保持土壤						本項新增。

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
				<u>濕潤。</u>						
胡蘿蔔	根瘤線 蟲	0.5 公升	3,000	播種後子葉 展開時，於 土壤濕潤情 形下，將稀 釋液噴佈於 土表。						本項新 增。
馬鈴薯	根瘤線 蟲	0.5 公升	3,000	於植株定植 後第 3 天， 澆灌藥液 1 次，施用前 請保持土壤 濕潤。						本項新 增。