

「福賽亞汰尼」農藥使用方法及其範圍

中華民國 112 年 11 月 24 日農授防字第 1121489954B 號公告修正

77%(w/w) 福賽亞汰尼 水分散性粒劑 (WG)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
番茄	青枯病	1.5 公斤	700	番茄定植後約 6 葉期開始全株葉面噴施。	7	連續 3 次		7		
甜椒	青枯病	1.5 公斤	700	定植後約 6 葉期開始全株葉面噴施。	7	連續 3 次		7		
辣椒	青枯病	1.5 公斤	700	定植後約 6 葉期開始全株葉面噴施。	7	連續 3 次		7		
茄子	青枯病	1.5 公斤	700	定植後約 6 葉期開始全株葉面噴施。	7	連續 3 次		7		
枸杞	青枯病	1.5 公斤	700	定植後約 6 葉期開始全株葉面噴施。	7	連續 3 次		7		
香瓜茄	青枯病	1.5 公斤	700	定植後約 6 葉期開始全株葉面噴施。	7	連續 3 次		7		
樹番茄	青枯病	1.5 公斤	700	定植後約 6 葉期開始全株葉面噴施。	7	連續 3 次		7		
檬果	細菌性 黑斑病	1.5 公斤	1,000	於檬果幼果期(BBCH 72)開始全株噴施。	7	連續 3 次		7		本項新增。原始登記廠商名稱：台灣拜耳股份有限公司。