

「貝萊斯芽孢桿菌 BF」農藥使用方法及其範圍

中華民國 113 年 9 月 9 日農授防字第 1131876644B 號公告修正

1x10⁹ CFU/mL 貝萊斯芽孢桿菌 BF 水懸劑 (SC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
水稻	白葉枯病	1.67 公升	600	病害發生初期開始施藥。	7	連續 3 次			全株均勻噴施。	
豆科乾豆類	炭疽病	0.8-2.5 公升	600	病害發生初期開始施藥。	7	連續 3 次				
油菜	炭疽病	0.4-1.66 公升	600	病害發生初期開始施藥。	7	連續 3 次			適用於油菜籽。	
向日葵	炭疽病	0.4-1.66 公升	600	病害發生初期開始施藥。	7	連續 3 次				
十字花科包葉菜類	炭疽病	0.4-1.66 公升	600	病害發生初期開始施藥。	7	連續 3 次				
菊科包葉菜類	炭疽病	0.4-1.66 公升	600	病害發生初期開始施藥。	7	連續 3 次				
旋花科小葉菜類	炭疽病	0.42-2.5 公升	600	病害發生初期開始施藥。	7	連續 3 次				
豆科小葉菜類	炭疽病	0.8-2.5 公升	600	病害發生初期開始施藥。	7	連續 3 次				
十字花科小葉菜類	炭疽病	0.4-1.66 公升	600	病害發生初期開始施藥。	7	連續 3 次				
菊科小葉菜類	炭疽病	0.4-1.66 公升	600	病害發生初期開始施藥。	7	連續 3 次				
枸杞	炭疽病	0.8-2.5 公升	600	病害發生初期開始施	7	連續 3 次			適用於枸杞	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事 項	說明
				藥。					葉。	
蔥科小葉 菜類	炭疽病	1.3-3.3 公升	600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 3 次				
龍鬚菜	炭疽病	1.66- 2.5 公 升	600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 3 次				
繖形花科 小葉菜類	炭疽病	1.66 公 升	600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 3 次				
菠菜	炭疽病	0.4- 1.66 公 升	600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 3 次				
莧菜	炭疽病	0.4- 1.66 公 升	600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 3 次				
山蘇	炭疽病	0.4- 1.66 公 升	600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 3 次				
龍骨瓣苣 菜	炭疽病	2-3 公 升	600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 3 次				
旋花科根 菜類	炭疽病	0.42- 2.5 公 升	600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 3 次				
豆科根菜 類	炭疽病	0.8-2.5 公升	600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 3 次				
山藥	炭疽病	1.66- 2.5 公 升	600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 3 次				
十字花科 根菜類	炭疽病	0.4- 1.66 公 升	600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 3 次				
菊科根菜 類	炭疽病	0.4- 1.66 公 升	600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 3 次				

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
馬鈴薯	炭疽病	0.8-2.5公升	600	病害發生初期開始施藥。	7	連續3次				
蔥科根菜類	炭疽病	1.3-3.3公升	600	病害發生初期開始施藥。	7	連續3次				
胡蘿蔔	炭疽病	1.66公升	600	病害發生初期開始施藥。	7	連續3次				
菱角	炭疽病	1.66公升	600	病害發生初期開始施藥。	7	連續3次				
茄科果菜類	炭疽病	0.8-2.5公升	600	病害發生初期開始施藥。	7	連續3次				
甜椒	炭疽病	2公升	600	幼果期開始施藥。	7	連續3次				
洛神葵	炭疽病	1-2公升	600	病害發生初期開始施藥。	7	連續3次				
瓜菜類	炭疽病	1.66-2.5公升	600	病害發生初期開始施藥。	7	連續3次				
豆菜類	炭疽病	0.8-2.5公升	600	病害發生初期開始施藥。	7	連續3次				
果樹	炭疽病	0.8-5公升	600	幼果期開始施藥。	7	連續4次				
葡萄	晚腐病	1.3-2.7公升	600	開花期開始施藥，每隔7天施藥1次，至套袋前為止。	7					
蓮霧	炭疽病	5公升	600	開花盛期開始施藥，每隔7天施藥1次，連續	7					

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事 項	說明
				4 次，在套 袋前完成施 藥。						
花木	炭疽病	0.8-3.3 公升	600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 4 次				
菊	炭疽病	0.4- 1.66 公 升	600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 3 次				
山防風	炭疽病	0.4- 1.66 公 升	600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 3 次				
風茹	炭疽病	0.4- 1.66 公 升	600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 3 次				
艾草	炭疽病	0.4- 1.66 公 升	600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 3 次				
當歸	炭疽病	1.66 公 升	600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 3 次				
金線連	炭疽病	0.42- 2.5 公 升	600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 3 次				
咖啡	炭疽病	1.2-2.5 公升	600	開花期或幼 果期開始施 藥。	7	連續 4 次				
<u>可可、</u> <u>破布子、</u> <u>愛玉子、</u> <u>檳榔</u>	<u>炭疽病</u>	<u>0.8-5</u> <u>公升</u>	<u>600</u>	<u>幼果期開始</u> <u>施藥。</u>	<u>7</u>	<u>連續 4</u> <u>次</u>				本項新 增。

1x10⁹ CFU/g 貝萊斯芽孢桿菌 BF 可溼性粉劑 (WP)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
水稻	白葉枯病	1.67 公 斤	600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 3 次				
水稻	細菌性 條斑病	1.67 公 斤	600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 3 次				
豆科乾豆 類	炭疽病	0.8-2.5 公斤	600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 3 次				
豆科乾豆 類	灰黴病	0.8-2.5 公斤	600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 3 次				
豆科乾豆 類	葉燒病	0.8-2.5 公斤	600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 4 次				
十字花科 乾豆類	炭疽病	0.4- 1.66 公 斤	600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 3 次				
油菜	黑腐病	1.66 公 斤	600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 4 次			適用於 油菜 籽。	
菊科乾豆 類	炭疽病	0.4- 1.66 公 斤	600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 3 次				
向日葵	灰黴病	0.4-1.7 公斤	600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 3 次				
十字花科 包葉菜類	炭疽病	0.4- 1.66 公 斤	600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 3 次				
十字花科 包葉菜類	黑腐病	1.66 公 斤	600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 4 次				
菊科包葉 菜類	炭疽病	0.4- 1.66 公 斤	600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 3 次				

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事 項	說明
菊科包葉 菜類	灰黴病	0.4-1.7 公斤	600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 3 次				
結球萵苣	細菌性 斑點病	1.3-1.7 公斤	600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 4 次				
旋花科小 葉菜類	炭疽病	0.42- 2.5 公 斤	600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 3 次				
蕓菜	灰黴病	1.7-2.5 公斤	600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 3 次				
豆科小葉 菜類	炭疽病	0.8-2.5 公斤	600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 3 次				
豆科小葉 菜類	灰黴病	0.8-2.5 公斤	600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 3 次				
豆科小葉 菜類	葉燒病	0.8-2.5 公斤	600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 4 次				
十字花科 小葉菜類	炭疽病	0.4- 1.66 公 斤	600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 3 次				
十字花科 小葉菜類	黑腐病	1.66 公 斤	600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 4 次				
芥藍	灰黴病	1.0-1.7 公斤	600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 3 次				
菊科小葉 菜類	炭疽病	0.4- 1.66 公 斤	600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 3 次				
菊科小葉 菜類	灰黴病	0.4-1.7 公斤	600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 3 次				
不結球萵	細菌性	1.3-1.7	600	病害發生初	7	連續 4				

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事 項	說明
苣與半結 球莴苣	斑點病	公斤		期開始施 藥。		次				
茄科小葉 菜類	炭疽病	0.8-2.5 公斤	600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 3 次				
茄科小葉 菜類	灰黴病	0.8-2.5 公斤	600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 3 次				
茄科小葉 菜類	細菌性 斑點病	0.8-2.5 公斤	600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 4 次				
蔥科小葉 菜類	炭疽病	1.3-3.3 公斤	600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 3 次				
蔥科小葉 菜類	灰黴病	1.3-1.7 公斤	600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 3 次				
葫蘆科小 葉菜類	炭疽病	1.66- 2.5 公 斤	600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 3 次				
繖形花科 小葉菜類	炭疽病	1.66 公 斤	600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 3 次				
芹菜	灰黴病	0.4-1.3 公斤	600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 3 次				
芫荽	細菌性 葉枯病	0.4-0.5 公斤	600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 4 次				
莧菜	炭疽病	0.4- 1.66 公 斤	600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 3 次				
山蘇	炭疽病	0.4- 1.66 公 斤	600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 3 次				
龍骨瓣菩 菜	炭疽病	2-3 公 斤	600	病害發生初 期開始施	7	連續 3 次				

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事 項	說明
				藥。						
旋花科根 菜類	炭疽病	0.42- 2.5 公 斤	600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 3 次				
豆科根菜 類	炭疽病	0.8-2.5 公斤	600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 3 次				
豆科根菜 類	灰黴病	0.8-2.5 公斤	600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 3 次				
豆科根菜 類	葉燒病	0.8-2.5 公斤	600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 4 次				
山藥	炭疽病	1.66- 2.5 公 斤	600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 3 次				
十字花科 根菜類	炭疽病	0.4- 1.66 公 斤	600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 3 次				
十字花科 根菜類	黑腐病	1.66 公 斤	600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 4 次				
菊科根菜 類	炭疽病	0.4- 1.66 公 斤	600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 3 次				
菊科根菜 類	灰黴病	0.4-1.7 公斤	600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 3 次				
茄科根菜 類	炭疽病	0.8-2.5 公斤	600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 3 次				
茄科根菜 類	灰黴病	0.8-2.5 公斤	600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 3 次				
茄科根菜 類	細菌性 斑點病	0.8-2.5 公斤	600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 4 次				

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
蔥科根菜類	炭疽病	1.3-3.3 公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7	連續 3 次				
蔥科根菜類	灰黴病	1.3-1.7 公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7	連續 3 次				
繖形花科根菜類	炭疽病	1.66 公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7	連續 3 次				
金針	灰黴病	1.3-3.3 公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7	連續 3 次			適用於碧玉筍。	
菱角	炭疽病	1.66 公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7	連續 3 次				
蘆筍	灰黴病	1.7-2 公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7	連續 3 次				
茄科果菜類	炭疽病	0.8-2.5 公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7	連續 3 次				
茄科果菜類	灰黴病	0.8-2.5 公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7	連續 3 次				
茄科果菜類	細菌性斑點病	0.8-2.5 公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7	連續 4 次				
甜椒	炭疽病	2 公斤	600	幼果期開始施藥。	7	連續 3 次				
金針	灰黴病	1.3-3.3 公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7	連續 3 次			適用於金針花。	
錦葵科果菜類	炭疽病	1-2 公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7	連續 3 次				
洛神葵	灰黴病	1-2 公斤	600	病害發生初期開始施	7	連續 3 次				

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
				藥。						
秋葵	灰黴病	1-1.7公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7	連續3次				
葫蘆科瓜果類	炭疽病	1.66-2.5公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7	連續3次				
豆菜類	灰黴病	0.8-2.5公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7	連續3次				
豆菜類	葉燒病	0.8-2.5公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7	連續4次				
豆科豆菜類	炭疽病	0.8-2.5公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7	連續3次				
葫蘆科瓜果類	炭疽病	1.66-2.5公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7	連續3次				
果樹	炭疽病		600	病害發生初期開始施藥。	7	連續4次				
草莓	炭疽病	1.3-3.3公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7	連續3次				
草莓	灰黴病	2公斤	600	病害發生初期開始施藥，每隔7天施藥一次，連續三次；進一步施藥則視病害發展和藥劑的持效期而定。						
葡萄	灰黴病	1.3-2.7公斤	600	病害發生初期開始施	7	連續4次				

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
				藥。						
葡萄	晚腐病		600	病害發生初期開始施藥。	7	連續 4 次				
楊桃	灰黴病	1.3-2.7 公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7	連續 4 次				
蓮霧	炭疽病	5 公斤	600	開花盛期開始施藥。	7	連續 4 次				
檬果	細菌性黑斑病	2 公斤	600	葉部發病初期開始，每隔 7 天施藥一次，連續 3 次。幼果形成後開始施藥，每隔 7 天施藥一次，連續 4 次。						
梨	灰黴病	1.7-3.3 公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7	連續 4 次				
桃	灰黴病	1.7-3.3 公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7	連續 4 次				
桃	穿孔病	1.67-3.3 公斤	600	幼果期開始施藥。	7	連續 3 次				
李	穿孔病	1.67-3.3 公斤	600	幼果期開始施藥。	7	連續 3 次				
柿	灰黴病	1.66 公斤	600	病害發生初期開始施藥，每隔 7 天施藥一次，連續三次；進一步						

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事 項	說明
				施藥則視病 害發展和藥 劑的持效期 而定。						
柑桔類	潰瘍病	1.3- 4 公斤	600	幼果期開始 施藥。	7	連續 3 次				
花木	炭疽病		600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 4 次			限林木 使用。	
花木	灰黴病	1-2 公 斤	600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 3 次				
菊	灰黴病	0.4-1.7 公斤	600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 3 次				
百合	灰黴病	1.3-3.3 公斤	600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 3 次				
茶	赤葉枯 病	1.67 公 斤	600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 4 次				
黃耆	灰黴病	0.8-2.5 公斤	600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 3 次				
黃耆	葉燒病	0.8-2.5 公斤	600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 4 次				
山防風	灰黴病	0.4-1.7 公斤	600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 3 次				
風茹	灰黴病	0.4-1.7 公斤	600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 3 次				
艾草	灰黴病	0.4-1.7 公斤	600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 3 次				
當歸	炭疽病	1.66 公	600	病害發生初	7	連續 3				

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事 項	說明
		斤		期開始施 藥。		次				
金線連	炭疽病	0.42- 2.5 公 斤	600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 3 次				
咖啡	炭疽病		600	病害發生初 期開始施 藥。	7	連續 4 次				
<u>可可、</u> <u>破布子、</u> <u>愛玉子、</u> <u>檳榔</u>	<u>炭疽病</u>		<u>600</u>	<u>病害發生初</u> <u>期開始施</u> <u>藥。</u>	<u>7</u>	<u>連續 4</u> <u>次</u>				本項新 增。