

## 「布芬淨」農藥使用方法及其範圍

中華民國 113 年 11 月 26 日農授防字第 1131878435F 號公告修正

40(%) (w/w) 布芬淨 水懸劑 (SC)

| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量     | 稀釋倍數      | 使用時期            | 施藥間隔(天) | 施藥次數 | 施藥方法                                                                                   | 安全採收期(天) | 注意事項                                      | 說明 |
|------|------|-------------|-----------|-----------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|----|
| 水稻   | 褐飛蟲  | 0.48 公升     | 2,500     | 孕穗末期若蟲發生盛期。     |         |      |                                                                                        | 15       | 1. 本劑對若蟲防治效果較佳。<br>2. 宜於水稻孕穗末期若蟲發生盛期使用一次。 |    |
| 水稻   | 斑飛蟲  | 0.5 公升      | 加水至 15 公升 | 一期作插秧後 40-50 天。 |         |      | 1. 空中施藥：每 8 平方公分相紙內應有直徑 1,000 $\mu$ 以下之藥點 135 點以上。<br>2. 人力噴藥：稀釋 2,000 倍，每穗 1-2 隻斑飛蟲時。 | 15       | 避免南瓜田使用，以免藥害。                             |    |
| 花椰菜  | 銀葉粉蟲 | 0.67-0.8 公升 | 1,500     | 害蟲發生時開始施        |         | 2    |                                                                                        | 15       |                                           |    |

| 作物名稱 | 病蟲名稱  | 每公頃每次用量      | 稀釋倍數  | 使用時期             | 施藥間隔(天) | 施藥次數  | 施藥方法 | 安全採收期(天) | 注意事項                | 說明 |
|------|-------|--------------|-------|------------------|---------|-------|------|----------|---------------------|----|
|      |       |              |       | 藥。               |         |       |      |          |                     |    |
| 小葉菜類 | 粉蝨類   | 0.6-0.9 公升   | 2,500 | 害蟲發生時開始施藥。       | 7       | 2     |      | 6        |                     |    |
| 瓜菜類  | 粉蝨類   | 0.67-1.13 公升 | 1,500 | 害蟲發生時開始施藥。       | 7       | 共 2 次 |      | 7        |                     |    |
| 瓜果類  | 粉蝨類   | 0.67-1.13 公升 | 1,500 | 害蟲發生時開始施藥。       | 7       |       |      | 15       |                     |    |
| 檬果   | 葉蟬類   |              | 1,200 | 抽穗及開花期害蟲發生時開始施藥。 | 10      |       |      | 15       | 為保護授粉昆蟲及天敵，盛花期避免施藥。 |    |
| 檬果   | 檬果木蝨  | 0.38-0.81 公升 | 1,200 | 害蟲發生時開始施藥。       | 7       |       |      | 15       |                     |    |
| 梨    | 梨木蝨   | 0.96 公升      | 2,500 | 害蟲發生時開始施藥。       | 7       | 2     |      | 9        |                     |    |
| 印度棗  | 粉介殼蟲類 | 0.6-0.8 公升   | 1,500 | 害蟲發生時施藥 1 次。     |         |       |      | 6        |                     |    |
| 柑桔類  | 盾介殼蟲類 | 1-1.5 公升     | 1,500 | 害蟲發生時施藥 1 次。     |         |       |      | 18       |                     |    |
| 花木   | 粉蝨類   | 0.4-0.8 公升   | 1,500 | 害蟲發生時開           | 7       |       |      |          | 限觀賞花卉使用，使用          |    |

| 作物名稱 | 病蟲名稱  | 每公頃<br>每次用量   | 稀釋<br>倍數 | 使用時期         | 施藥<br>間隔<br>(天) | 施藥<br>次數 | 施藥<br>方法 | 安全採<br>收期<br>(天) | 注意事項          | 說明    |
|------|-------|---------------|----------|--------------|-----------------|----------|----------|------------------|---------------|-------|
|      |       |               |          | 始施藥。         |                 |          |          |                  | 前宜先進行小面積藥害測試。 |       |
| 菊    | 粉蝨類   | 0.2-0.8<br>公升 | 1,500    | 害蟲發生時開始施藥。   | 7               |          | 藥液應噴到葉背。 | 12               |               |       |
| 茶    | 柑桔刺粉蝨 | 0.5 公升        | 2,000    | 若蟲發生初期施藥。    |                 |          |          | 15               |               |       |
| 咖啡   | 介殼蟲類  | 1.0-1.5<br>公升 | 1,500    | 害蟲發生時施藥 1 次。 |                 |          |          | 7                |               |       |
| 可可   | 介殼蟲類  | 1.0-1.5<br>公升 | 1,500    | 害蟲發生時施藥 1 次。 |                 |          |          | 7                |               | 本項新增。 |

25(%) (w/w) 布芬淨 可溼性粉劑 (WP)

| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃<br>每次用量 | 稀釋<br>倍數 | 使用時期        | 施藥<br>間隔<br>(天) | 施藥<br>次數 | 施藥<br>方法 | 安全採<br>收期<br>(天) | 注意事項                                                   | 說明 |
|------|------|-------------|----------|-------------|-----------------|----------|----------|------------------|--------------------------------------------------------|----|
| 水稻   | 褐飛蝨  | 0.8 公<br>斤  | 1,500    | 孕穗末期若蟲發生盛期。 |                 |          |          | 15               | 1. 本劑對若蟲防治效果較佳。<br>2. 宜於水稻孕穗末期若蟲發生盛期使用一次。<br>3. 本劑試驗時加 |    |

| 作物<br>名稱 | 病蟲<br>名稱 | 每公頃<br>每次用<br>量 | 稀釋<br>倍數 | 使用時<br>期                             | 施藥<br>間隔<br>(天) | 施藥<br>次數 | 施藥<br>方法                      | 安全採<br>收期<br>(天) | 注意事項                                                                     | 說明 |
|----------|----------|-----------------|----------|--------------------------------------|-----------------|----------|-------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|----|
|          |          |                 |          |                                      |                 |          |                               |                  | 「新利農」展著劑 3,000 倍。                                                        |    |
| 水稻       | 斑飛蟲      | 0.8 公<br>斤      | 1,500    | 孕穗期<br>後若蟲<br>發生高<br>時。              |                 |          | 孕穗期後若<br>蟲發生密度<br>高時施藥一<br>次。 | 15               | 本劑試驗時<br>加「新利農<br>展著劑」<br>3,000 倍。                                       |    |
| 花椰菜      | 銀葉粉<br>蟲 | 1-1.2<br>公斤     | 1,000    | 害蟲發<br>生時開<br>始施<br>藥。               |                 | 2        |                               | 15               |                                                                          |    |
| 芥藍       | 銀葉粉<br>蟲 | 1-1.5 公<br>斤    | 1,500    | 害蟲發<br>生時開<br>始施<br>藥。               | 7               | 2        |                               | 6                |                                                                          |    |
| 瓜菜類      | 粉蟲類      | 1-1.7 公<br>斤    | 1,000    | 害蟲發<br>生時開<br>始施<br>藥。               | 7               | 共 2<br>次 |                               | 7                |                                                                          |    |
| 瓜果類      | 粉蟲類      | 1-1.7 公<br>斤    | 1,000    | 害蟲發<br>生時開<br>始施<br>藥。               | 7               |          |                               | 15               |                                                                          |    |
| 瓜果類      | 銀葉粉<br>蟲 | 1-1.7 公<br>斤    | 1,000    | 害蟲發<br>生時開<br>始施<br>藥。               | 7               |          |                               | 15               |                                                                          |    |
| 檬果       | 葉蟬類      |                 | 750      | 抽穗及<br>開花期<br>害蟲發<br>生時開<br>始施<br>藥。 | 10              |          |                               | 15               | 為保護授粉<br>昆蟲及天<br>敵，盛花期<br>避免施藥。<br>2. 本劑試驗<br>時加展著劑<br>「新利農」<br>3,000 倍。 |    |

| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量   | 稀釋倍數  | 使用時期            | 施藥間隔(天) | 施藥次數 | 施藥方法     | 安全採收期(天) | 注意事項                    | 說明    |
|------|------|-----------|-------|-----------------|---------|------|----------|----------|-------------------------|-------|
| 檬果   | 檬果木蝨 | 0.6-1.3公斤 | 750   | 害蟲發生時開始施藥。      | 7       |      |          | 15       |                         |       |
| 梨    | 梨木蝨  | 1.6 公斤    | 1,500 | 害蟲發生時開始施藥。      | 7       | 2    |          | 9        |                         |       |
| 花木   | 粉蝨類  | 0.6-1.2公斤 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥。      | 7       |      |          |          | 限觀賞花卉使用，使用前宜先進行小面積藥害測試。 |       |
| 花木   | 銀葉粉蝨 |           | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥。      | 7       |      | 應噴到葉背。   |          | 限觀賞花卉使用，使用前宜先進行小面積藥害測試。 |       |
| 菊    | 粉蝨類  | 0.3-1.2公斤 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥。      | 7       |      | 藥液應噴到葉背。 | 12       |                         |       |
| 菊    | 溫室粉蝨 | 0.6-1.2公斤 | 1,000 | 發現葉片有溫室粉蝨時開始施藥。 | 7       |      | 藥液應噴到葉背。 |          |                         |       |
| 咖啡   | 介殼蟲類 | 1.6-2.4公斤 | 1,000 | 害蟲發生時施藥 1 次。    |         |      |          | 7        |                         |       |
| 可可   | 介殼蟲類 | 1.6-2.4公斤 | 1,000 | 害蟲發生時施藥 1 次。    |         |      |          | 7        |                         | 本項新增。 |