

「亞克瑞」農藥使用方法及其範圍

中華民國 114 年 4 月 10 日農授防字第 1141875597B 號公告

一、新農藥普通名稱一覽表

普通名稱	英文普通名稱	IUPAC/有效成分
亞克瑞	Isocycloseram	mixture comprised of 80–100% 4-[(5S)-5-(3,5-dichloro-4-fluorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl]-N-[(4R)-2-ethyl-3-oxo-1,2-oxazolidin-4-yl]-2-methylbenzamide and 20–0% of the (5R,4R), (5R,4S) and (5S,4S) isomers

二、「亞克瑞」農藥使用方法與範圍一覽表

100 g/L (10% w/v) 亞克瑞 水分散性乳劑(DC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
十字花科包葉菜類	小菜蛾	0.33 公升	3,000	害蟲發生初期施藥 1 次，每隔 7-14 天施藥 1 次。		共 2 次		3	開花期及生物防治期間避免施藥。	原始登 記廠商 名稱：台 灣先正 達股份 有限公 司
番茄 茄子 甜椒 辣椒 枸杞 香瓜 茄樹 番茄	薊馬類	0.33- 0.67 公 升	3,000	害蟲發生初期施藥 1 次，每隔 7 天施藥 1 次。		共 2 次		3	開花期及生物防治期間避免施藥。	
柑桔類	葉蟬類	0.33 公 升	6,000	害蟬發生初期（平均每葉達 3-5 隻）施藥 1 次。				14	開花期及生物防治期間避免施藥。	