

## 「福賽絕」農藥使用方法及其範圍

中華民國 114 年 4 月 10 日農授防字第 1141875597D 號公告修正

15%(w/w) 福賽絕 乳劑 (EC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
番茄	根瘤線蟲	10 公升	120-200	移植當日畦上應開溝深 15 公分條施之，施藥後可立即栽植。					限於移植當日施藥。	
洋香瓜 香瓜 西瓜	根瘤線蟲	10 公升	200	種植當日將藥劑條施於植溝內，並覆土再種植。					限於移植當日施藥。	本項修正。
松樹	松材線蟲		25	於松樹休眠期，將稀釋藥液依樹木胸徑大小之用量，距樹基部 1-1.5 公尺處，以高壓灌注器將藥液灌注土壤中。每年施藥 1 次。					1. 每公頃每次用藥量：胸徑小於 15 公分之植株施用 16 公升，植株胸徑每增長 5 公分，增加 10-25 公升。 2. 限於移植當日施藥。	
番石榴	根瘤線蟲	5 公升	1,000	強剪枝條當天施用 1 次，		共 2 次		90-100	施藥前保持樹冠下土壤	本項新增。原

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
				35 天後再施用 1 次。					濕潤，以每平方公尺澆灌 2 公升稀釋藥液，依據樹冠下面積調整澆灌藥液量。	始登記廠商名稱：台灣石原產業股份有限公司。

10%(w/w) 福賽絕 粒劑 (GR)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
番茄	根瘤線蟲	20 公斤		移植當日施藥					開溝 15 公分深條施之,即行覆土。	
洋香瓜 香瓜 西瓜	根瘤線蟲	20 公斤		種植當日施藥					將藥劑條施植溝內,覆土再種植。	本項修正。